



Πρόληψη

Οι περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας μπορούν να προληφθούν

- Το τεστ Παπανικολάου αποτελεί μία αποδεδειγμένη μέθοδο για την εύρεση προ-καρκινικών μορφών, προτού εξελιχθούν σε καρκίνο.
- Το HPV DNA τεστ συμβάλλει στον εντοπισμό των γυναικών που έχουν μολυνθεί από τύπους HPV υψηλού κινδύνου. Χρησιμοποιείται στον πρωταρχικό πλυσυσματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, μόνο του ή σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου, στη διαλογή γυναικών με πρώιμες παθολογικές μεταβολές των κυττάρων και στον έλεγχο της θεραπείας.
- Η αποφυγή δημιουργίας προ-καρκινικών μορφών πραγματοποιείται μέσω του εμβολιασμού κατά του ιού HPV. Μέσω των προγραμμάτων εμβολιασμού, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας θα μειωθεί.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ



Interreg
Greece-Bulgaria
HS Care
European Regional Development Fund

Πηγή: www.forher.gr

www.hscare-synexizo.gr

[f /SynexiZO.HSCare](https://www.facebook.com/SynexiZO.HSCare)



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Interreg 
EUROPEAN UNION

Greece-Bulgaria

HS Care

European Regional Development Fund



synexizo
let's get together

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Η 4η πιο κοινή μορφή γυναικείου καρκίνου

Η εικόνα της νόσου σήμερα



Παγκοσμίως:

528.000 νέα περιστατικά / χρόνο



Ευρώπη:

4η πιο κοινή μορφή καρκίνου στις γυναίκες



Ελλάδα:

400 νέα περιστατικά / χρόνο



Θυμηθείτε!

Για τις μητέρες με κόρες

Ενημερωθείτε για τα οφέλη του εμβολιασμού σε νεαρή ηλικία



Για όλες τις γυναίκες

Κάθε χρόνο προγραμματίστε το γυναικολογικό μας έλεγχο.



Οι περισσότεροι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας μπορούν να προληφθούν

- Ο ιός HPV ανιχνεύεται στο 99% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας
- Το τεστ Παπανικολάου αποτελεί μια αποδεδειγμένη μέθοδο για την εύρεση προ-καρκινικών μορφών, προτού εξελιχθούν σε καρκίνο
- Το τεστ Παπανικολάου σε συνδυασμό με το HPV τεστ προτείνονται για το μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο
- Η αποφυγή δημιουργίας προ-καρκινικών μορφών πραγματοποιείται μέσω του εμβολιασμού ενάντια στον ιό HPV

Το 1/2

των γυναικών που θα διαγνωστούν με καρκίνο του τράχηλου της μήτρας είναι μεταξύ 20 και 45 ετών, στην πιο παραγωγική δηλαδή περίοδο της ζωής τους.



Παράγοντες κινδύνου

Ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι η εμμένουσα λοίμωξη από τον ιό HPV (human papillomavirus - ανθρώπινος ιός θηλωμάτων)

01

το κάπνισμα

02

Η ανοσοκαταστολή

03

Προηγούμενη ή παρούσα σεξουαλικών μεταδιδόμενη λοίμωξη

04

Η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικής αγωγής

05